

# Onanizacja dzieci do lat 3

## Faza preedypalna



JOANNA MIKULSKA

## Definicja:



Masturbacja dziecięca definiowana jest jako stymulowanie przez dziecko własnego ciała- głównie obszarów erogennych- i wywoływanie w ten sposób uczucia przyjemności.

# Objawy:



- Przyspieszony oddech
- Zaczernienie
- Napięcie mięśni
- Nieskoordynowane ruchy
- Wydawanie dźwięków
- Chwilowa utrata kontaktu z otoczeniem

Te objawy upodabniają się do przeżyć dorosłych ale  
ale NIE mają takiego samego charakteru

# Onanizacja dziecięca nie ma jednolitego charakteru



Wyróżniamy 3 typy masturbacji dziecięcej:

- Rozwojowa
- Eksperymentalna
- Instrumentalna

# Rozwojowa

## Kryteria diagnostyczne



- Nastawienie na zaspokojenie przyjemności
- Powtarzalny schemat
- Przemija wraz z upływem czasu
- Niejawna, ukrywana
- Nie uszkadza ciała
- Brak uporczywości, podatna na wpływ

# Przyczyny:



- Poznawanie przez dziecko swojego ciała
- Czerpanie przyjemności poprzez pielęgnacje opiekuna
- Naśladowanie zachowań rówieśników
- Obserwacja dorosłych

# Jak zapobiegać?



- Tego typu ekspresja nie jest szkodliwa
- Nie jest destrukcyjna
- Dziecko poza odkrywaniem siebie nie oczekuje niczego innego
- Strefy intymne dziecko traktuje tak samo jak nos czy rączkę

# Eksperymentalna Kryteria diagnostyczne



- Nastawiona na zaspokojenie ciekawości badacza
- Brak stałego schematu
- Przemija po interwencji
- Jawna, nie ukrywana
- Może powodować uszkodzenia ciała
- Brak uporczywości, podatna na wpływ



# Przyczyny:



- Ciekawość, chęć badania co w efekcie daje przeżycie nieoczekiwanych przyjemnych doznań
- Zainteresowanie narządem płciowym odmiennym
- Dziecko poddaje eksperymentom swoje ciało od stymulacji rękoma po stymulacje przedmiotami

# Jak zapobiegać?



- Onanizacja eksperymentalna może być niebezpieczna dla dziecka
- Dziecko powinno otrzymać wytłumaczenie i zakaz
- Obserwacja dziecka
- Odwracanie uwagi

# Instrumentalna Kryteria diagnostyczne



- Nastawienie na zaspokojenie innej potrzeby
- Powtarzalny schemat
- Przemija po zaspokojeniu potrzeby
- Jawna, demonstracyjna
- Rzadko powoduje uszkodzenia ciała
- Uporczywe trwanie aż do usunięcia przyczyny

# Przyczyny:



- Pozaseksualne takie jak:
  - stres
  - niepokój
  - nuda
  - zwrócenie na siebie uwagi
  - rozładowanie napięcia
  - samotność , odtrącenie
  - ingerencja dorosłych

# Jak zapobiegać?



- Trudne do rozpoznania
- Przede wszystkim skoncentrować się na PRZYCZYNNIE a nie SKUTKU
- Obserwacja dziecka
- Konsultacja z psychologiem
- Nie karać! Nie zawstydząć! Nie Krzyczeć!  
Nie lekceważyć!



- „Im bardziej dziecko czuje, że coś się przed nim ukrywa, tym bardziej będzie robiło wszystko żeby wiedzieć więcej.”

- prof. Henri Joyeux